J. L. Bg

Ornatiss^mo Celeberrimoq uiro P. M. Mersenno
C. Torricellius. S.

Ægre fero uitrum meum, quod Clar^mo Viro Magiotto miserā ab alio uitro superari. Sed dabo aliquando operā ne superetur tempori. Ex optimis apud me nullum habeo, neque habere possum ob penuriā primæ materiæ, quæ si quando haberi potest nec exigua, quolibet adamante pretiosior est. Quod ego addidi in fine libelli mei, uerum est non de omnibus, sed tantum de aliquibus, ijsq; perfectissimis licet hæc suprema sit, ittudq; demonstrationē habeat Geometrica, nihil unquā officiet boni nisi adimanta materiæ. quando hæc ab omni parte perfecta sit tunc fructus inuēti mei manifestē apparebit. Curabo ut ad te perferatur unus, fortasse et alterum ex meis uitris, (plura enim non habeo) ut experiaris quorum teste, cui Magiotto, uerum magis probetur. Deinde conueniet nobis displicēt mihi non posse hoc fragile munusculum offerre ea liberalitate qua opto rem, et qua deberem, præsertim ergo tantum uirum, ob paupertatem meam. Perlegi iā libellum quem ad me misisti, de quo nix iudicium meum proferre ausim. Multa in eo placent, sed non omnia. Deinde credam ego | affirmantibus nobis | ex barbaro Codice descriptum et emendatum fuisse, sed non ideo credam ab eo Aristarchi descendisse, quicquid sit, magni quidem philosophi, et Astronomi inuentum est. Nugas Geometricas, quas ex me petis, mitto. Hoc unum oro, ne demonstrationes ipsas in | Gallia Maximis Geometris mittas; nimis enim puerilis sunt. Si placuerit. Conclusiones tantum mittere, poteris hac modo.

953 Sale 1865 or 6

1

52

Maximus rectangulus quod contineri potest sub semicirculi
vel semiellipsis perpendiculari, et altero segmentorum a
illud est cuius alterum latus continet $\frac{3}{4}$ ipsius axis.

Max.^m superficies cylindrica quę intra sphæram describi potest, ea
est cuius rectangulus per axem quadratus est.

Quę verò in spheroide oblongo, ea est cuius basis diameter
ad diametrum spheroidis sit ut latus quadrati alicuius ad
propriam diametrum. In spheroide verò prolata, ea
est cuius axis ad axem spheroidis sit in ratione prædicta.

Quę vero in conoide parabolico ea est cuius altitudo ad alti-
tudinem conoidis sit subsesquialtera. At quę in fusoparа-
bolico ea est cuius basis ad maximum suum circulum sit
ut $\frac{1}{2}$ ad 9 ~~habet ad 9~~ Demonstrationes vide locis solidis sunt apud
Celeberrimum Virum M. Mersennum.

Quidquid ego certe habeo omnia hæc theoremata cum innumeris aliis
elegantioribus et universalioribus demonstrata fuisse a Clar.^mo Geo-
metra Gallo. Ego ab hujusmodi laudis relatam nisi dedignentur
gravibus ipsorum curis tenues subsecivas conatus meos.
Vale. Lugduni Bat.^or 9 Die 9 Januarij anni 1645.

D.^r Commercij della Lingua Italiana del Sig.^r Pierrotti Vicario
Vicentijs 1602. Domini Rodriguez